

Point Pelee

7-16 mei 2022




Georganiseerd door:



www.birdingbreaks.nl

Reisschema



Dag 1	7 mei	Amsterdam – Toronto – Niagara Falls
Dag 2	8 mei	Niagara Falls – Long Point
Dag 3	9 mei	Long Point
Dag 4	10 mei	Long Point – Rondeau
Dag 5	11 mei	Rondeau
Dag 6	12 mei	Rondeau – Point Pelee
Dag 7	13 mei	Point Pelee
Dag 8	14 mei	Point Pelee
Dag 9	15 mei	Lake St. Clair – Point Pelee
Dag 10	16 mei	Point Pelee – Mosa Forest – Toronto
	17 mei	Aankomst in Amsterdam

Dag 1 (7 mei): Amsterdam – Toronto – Niagara Falls

Vanwege grote drukte op Schiphol moesten de deelnemers daar extra lang van tevoren aanwezig zijn, maar verder liep alles soepel tijdens de reis met een directe vlucht naar Toronto. Aangezien ik niet in Nederland woon maar relatief dichtbij Toronto in de Verenigde Staten, pikte ik de deelnemers op in de luchthaven van Toronto. Even na drieën reden we zuidwaarts richting Lake Ontario – een stuk met weinig natuur, maar de eerste **Turkey Vultures**, **Red-tailed Hawk**, **Mourning Doves** en **Red-winged Blackbirds** werden alvast waargenomen vanuit het busje.

Rond de Burlington Canal Bridge maakten we twee korte stops bij kolonies **Double-crested Cormorants**, **Ring-billed Gulls** (*Ringsnavelmeeuwen*) en **Caspian Terns** (*Reuzensterms*), en zagen we onze eerste doelsoort: een **Northern Mockingbird** (*Spotlijster*). Ondanks de naam is deze soort, die zowel qua gedrag als kleed wat aan een klapekster doet denken, nogal schaars zo ver noordelijk. De vogel liet zich leuk bekijken: na op afstand op hekwerk te hebben gezeten kwam 'ie recht op ons afvliegen en foerageerde daarna vlakbij op de grond.

Al oostelijk rijdend vlak langs de oever van Lake Ontario bezochten we het Forty Mile Creek Park, de enige keer dat we langs dit meer stopten – de rest van de reis zouden we vogelen nabij een tweede "Great Lake", Lake Erie. Lake Ontario is veel dieper dan Lake Erie en ook door de ligging verder naar het noordoosten trekt het meer soorten aan die we met zeeën associëren. Even met de telescoop scannen leverde meer dan honderd **White-winged Scoters** op, tegenwoordig gesplit van onze *Grote Zeeëend*, en een paar **Long-tailed Ducks** (*IJseend*) – onze enige waarnemingen van deze soorten.

In dit park zijn met enige regelmaat waarnemingen van Fish Crows, nog zo'n zuidelijke soort die hier erg lokaal is, en we hielden onze oren tevergeefs gespitst voor diens kenmerkende nasale roep. We konden het niet laten ook even door het strookje "riparian" bos in dit park te lopen en zagen meteen onze eerste warblers (**Yellow**, **Palm** en **Nashville Warbler**), prachtige **Blue Jays**, en zowel Carolina als Winter Wren. Laatstgenoemde, een split van onze Winterkoning, broedt met name noordelijker en zagen we maar een paar keer deze reis. Langs de rivier vonden we een luidruchtige rondvliegende Belted Kingfisher (*Bandijsvogel*), **Spotted Sandpipers** (*Am. Oeverloper*) en **Wood Ducks**, misschien wel de mooiste Noord-Amerikaanse eend. **White-throated Sparrows** (*Witkeelgors*) hebben twee kleurvormen ("white-stripe" en "tan-stripe") die in kleed én gedrag verschillen en we zagen een prachtig zingende white-stripe vorm – de soort broedt noordelijker maar deze kleurvorm zingt ook graag op doortrek.



Niagara River ten noorden van Niagara Falls

Na het avondeten maakten we nog twee korte stops om van het mooie uitzicht te genieten langs de Niagara River net ten noorden van de beroemde watervallen. Vanaf deze uitkijkpunten kijk je ver naar beneden naar de rivier, en de **Common Terns** (*Visdief*) die boven de rivier vlogen waren zelfs met de kijker maar net te zien. Ook zagen we hier de enige **Coyote** van de reis alvorens we naar het hotel in de stad Niagara Falls reden voor een welverdiende lange nachtrust.

Dag 2 (8 mei): Niagara Falls – Long Point



Horseshoe Falls, Niagara Falls

Als eerste stonden de spectaculaire Niagara Falls watervallen op het programma en die stelden niet teleur! De Verenigde Staten zijn hier direct aan de overkant van de rivier, maar het uitzicht op de de “Horseshoe Falls”, de meest indrukwekkende van de waterval-complexen, is veel beter vanaf de Canadese kant. We merkten uiteraard ook vogels op terwijl we langs de watervallen liepen, waaronder onze eerste knalgele **American Goldfinches**, **Common**

Grackles (*Glanstroepiaal*) met hun fraaie glans en maffe staart, **Chipping** en **Song Sparrows** (*Zanggors*) en **Northern Rough-winged Swallows**.

Tijdens de rit richting Long Point maakten we een belangrijke tussenstop in de “middle of nowhere” voor een aantal graslandsoorten. Daar zagen we vrijwel meteen **Cliff Swallow** (de minst algemene lokale zwaluwsoort), **Eastern Phoebe** en **Red-bellied Woodpecker**. Onverwacht was onze tweede **Northern Mockingbird** en ook kwamen we de gehoopte doelsoorten **Savannah Sparrow**, **Eastern Meadowlark** en twee mannetjes **Bobolink** tegen – dit ging hard! Hierna was het nog geen minuut rijden naar velden waar soms *Upland Sandpipers* broeden. Terwijl we genoten van meer *Bobolinks*, *Savannah Sparrows* en *Meadowlarks* die zich bovenop hooibalen prima lieten bekijken, hoorde ik de jodelende baltsroep van de **Upland Sandpiper** en zag de vogel uit zicht landen. Even later stonden we allemaal te kijken naar nog een prachtige, lange baltsvlucht van deze unieke en gewilde soort! De vogel bleef steeds landen in lang gras maar vlak voor vertrek zagen we hem even op een paaltje zitten. Ook zagen we onze eerste **Bald Eagle** en **Wild Turkey**, laatstgenoemde scherp opgemerkt door Richard.

Na deze zeer geslaagde stop hielden we een uitgebreide lunch, met het typisch Canadese gerecht poutine, voordat we doorreden naar het befaamde Backus Woods net ten noorden van Long Point. Dit fraaie “Carolinian” loofbos heeft een aantal voor deze reis exclusieve broedvogels, zoals *Louisiana Waterthrush*, *Pine Warbler* en *Yellow-bellied Sapsucker*. Het werd hier snel duidelijk dat het lokaal een laat voorjaar was, met nog erg weinig blad aan de bomen en nog weinig



♀ *Yellow-bellied Sapsucker*, Backus Woods

Neotropische (lange-afstands) trekvogels, waarvan hier velen broeden. Een aantal van de beste soorten waren dan ook nog aanwezige korte-afstandstrekken die we elders niet weer

zouden zien: een prachtige groep **Rusty Blackbirds** die karakteristiek op een natte plek in het bos op de grond foerageerden, een **Golden-crowned Kinglet** en een **Brown Creeper**. We genoten erg van de doelsoorten **Yellow-bellied Sapsucker** en **Pine Warbler** en zagen onze eerste **Blue-headed Vireo** en **White-breasted Nuthatches**. De schaarse *Louisiana Waterthrush* liet zich echter niet zien of horen en onze spechtenbingokaart was nog niet compleet – dus we moesten nog een keer terug dit bos in. Vlakbij het bos zagen we de enige **Otter** (*North American River Otter*) van de reis.



Tree Swallow, Long Point

Aan het eind van de middag bezochten we het gebied achter “Birds Canada” bezoekerscentrum langs Lake Erie, direct aan de voet van het Long Point schiereiland. Dankzij de aanwezigheid van nestkasten waren hier onze eerste **Purple Martins** en **Tree Swallows**, twee algemene maar toch érg fraaie en karaktervolle soorten, niet te missen. We moesten ons best doen om uitzicht op Lake Erie te krijgen vanaf de paden, maar dit was de moeite waard aangezien er een mooie

diversiteit aan eenden vlak langs de oever zwom: **Greater** en **Lesser Scaup** (*Topper* en *Kleine Topper*), **Ruddy Duck** (*Rosse Stekelstaart*), **American Wigeon** (*Am. Smient*) en **Green-winged Teal** (*Am. Wintertaling*), en bovenal een mannetje **Canvasback** en vijf **Redheads** (*Am. Tafeleend*). Deze soorten broeden hier niet en dunnen in mei snel uit – dit was dan ook onze beste dag voor eenden en enkele van deze soorten zagen we niet weer. Tot slot zagen we hier onze eerste erg charmante **Blue-grey Gnatcatchers** (altijd met dat staartje heen en weer!) en een **Northern Flicker** waarvan iedereen erg genoot en waarmee kwam een geslaagde eerste volle dag tot een einde kwam.

Dag 3 (9 mei): Long Point

Vandaag hadden we door omstandigheden helaas een erg late start, maar dat konden we snel goedmaken met een succesvolle eerste stop vlakbij Backus Woods, met bovenal prachtige waarnemingen van de doelsoort **Vesper Sparrow**. Ook zagen we hier veel **Field Sparrows** die door iedereen erg op prijs werden gesteld – onze groep was erg gecharmeerd van de Amerikaanse gorzen! De ook-al-zo-fraaie **Eastern Bluebirds** hier bleven opvallend genoeg de enige van de reis en de eerste van vele **Rose-breasted**



♂ *Vesper Sparrow, bij Backus Woods*

Grosbeaks maakten zich populair: een lieflijke zang, een onwijze snavel en prachtige kleuren met die wat onwerkelijke rode vlek ("bleeding heart") op de borst.

Net voor het middaguur gingen we terug naar Backus Woods. Spechten werkten hier vandaag goed mee en we namen zes soorten waar, waaronder de schaarsere **Hairy Woodpecker** en maar liefst zeven **Yellow-bellied Sapsuckers**. Voor de **Pileated Woodpecker** bleef het bij een hoorwaarneming – je ziet ze natuurlijk liever, maar de roffel en andere vocalizaties van deze soort zijn luid en indrukwekkend. Het hoogtepunt van de wandeling was een coöperatieve **Louisiana Waterthrush**! Deze *warbler* lijkt veel op *Northern Waterthrush* (Noordse Waterlijster), maar we konden kenmerken zoals de beperktere streping op de onderzijde goed zien en daarnaast is de zang geheel anders. Ook kregen we onze eerste indruk van de extreem hoge diversiteit aan warblers die dit deel van Noord-Amerika zo aantrekkelijk maakt, met onder andere **Black-and-White**, **Magnolia**, **Chestnut-sided**, **Black-throated Blue** en **Black-throated Green Warbler** die één voor één tevoorschijn schoten. Tot slot zagen we hier de erg leuke **Red-breasted Nuthatch** met z'n maffe trompetroepjes en een groepje **Cedar Waxwings** (*Cederpestvogel*).



Red-breasted Nuthatch (L) en ♂ Black-throated Blue Warbler (R), Backus Woods

Een korte stop bij een wetlandje (Port Rowan wetland) langs de route pakte goed uit: hier zagen we een schitterende **Common Loon** (*IJsduiker*), volledig in zomerkleed en op vrij korte afstand. Toevallig waren de twee aanwezige eendensoorten ook allebei nieuw: **Ring-necked Duck** (*Ringsnaveleend*) en **Bufflehead** (*Buffelkopeend*). De mannetjes *Bufflehead* vielen erg in de smaak: zo klein en zo opvallend zwart-wit!

Eindelijk gingen we dan het Long Point schiereiland zelf op, waar we een kampeerterrein verkenden dat goed is voor trekvogels. Hier waren indrukwekkende aantallen **Grey Catbirds** en **White-throated Sparrows** in de ondergroei aanwezig. Eigenlijk zo veel dat het lastig was niet alsmear naar de beweging bij de grond te blijven kijken – tenslotte wouden we ook graag zangers zien die hoger in de bomen zitten! Gelukkig had de ondergroei hier meer te bieden, zoals een **Brown Thrasher**, twee **Ovenbirds** en onze eerste *Catharus*-lijsters: twee **Veery's** en een **Hermit Thrush**. Laatstgenoemde was met name een prettige aanvulling: dit is een korte-afstandstrekker die vroeger in het seizoen piekt. En een vriendelijke Canadese vogelaar maakte ons alert op een **Eastern Screech-Owl** die in een den zat te slapen! Nieuwe warblers bleven ook binnenkomen met **American Redstart** en **Northern Parula** en we zagen onze eerste **Warbling Vireos**, **Orchard Oriole** en **Indigo Bunting**. Helaas pikten we de *Golden-winged Warbler* die hier vandaag was gezien niet mee.

We wisten van een verdwaalde **Black-necked Stilt** in een ondergelopen weiland waar we toevallig precies langs reden – een leuke bonus. Daarna hadden we vanaf onze tafel op het terras van het restaurant in het prachtige weer schitterend uitzicht op het moeras beneden ons (met langsvliegende **Sandhill Crane** (*Canadese Kraanvogel*) en **Bald Eagle**) en een goed gelegen bomenrij (**Baltimore Orioles** (*Baltimoretroepiaal*), **Eastern Towhee** en een scala warblersoorten) – een fijne afsluiter van de dag.



Epie fotografeert een Baltimore Oriole bij het restaurant, Long Point

Dag 4 (10 mei): Long Point – Rondeau

Vanochtend begonnen we met een kort bezoek aan nog een grasland voor **Grasshopper Sparrow**. Deze soort zit graag verscholen in het hoge gras en gister hoorden we er al één zingen. In de vroege ochtenduren zingt 'ie gelukkig ook regelmatig vanaf struiktopjes en al snel was het raak – het subtiel maar fraaie kleed van deze soort was goed te zien in de telescoop. De vogel gooit de kop in de nek tijdens het zingen, een leuk gezicht. Weer een gors, weer een publieksfavoriet voor onze groep!

Het was nog steeds redelijk vroeg in de ochtend en daarom een goed moment voor het moerasgebied aan het begin van het Long Point schiereiland, Big Creek Marsh. Hier zagen we al snel nieuwe soorten zoals **Pied-billed Grebe** (*Dikbekfuut*), **Common Gallinule**, **American Coot**, **Black Tern** (*Zwarte Stern*) en meerdere fraaie paartjes **Sandhill Cranes**. De hoogtepunten waren een **Sora** die zich dichtbij en bijna volledig open en bloot rondlopend fantastisch liet bekijken, en een paartje **American Bitterns** dat samen eindeloos rondjes bleven vliegen boven het moeras. Dit zijn niet de makkelijkste soorten dus het was erg prettig om zo van ze te kunnen genieten! Terwijl de diversiteit van zangvogels in rietmoeras hier niet zo hoog als in Europa, zijn er wel wat gespecialiseerde soorten zoals **Common Yellowthroat**, **Swamp Sparrow** en **Marsh Wren**. Alle drie lieten zich volop horen en de eerstgenoemde twee kregen we ook goed te zien.



Sora, Big Creek Marsh, Long Point



Sandhill Crane, Big Creek Marsh, Long Point

Bij aankomst in het moeras waren een **Least Flycatcher** in het enige struikje en een paar overvliegende warblers indicaties dat er ook goede aankomst van trekvogels was. Daarom was het nu hoog tijd om verder het Long Point schiereiland op te gaan. Daar zagen we een leuke diversiteit en aantallen zangvogels met de voor ons nieuwe en allemaal wel érg fraaie warblers **Cape May**, **Bay-breasted** en **Blackburnian**! Tientallen Myrtle Warblers (Mirtezanger)

en opvallend veel Ruby-crowned Kinglets hielden ons alert en we zagen een paar Green Herons in de dennen (!), een rap overvliegende **Northern Harrier** en onze eerste **Swainson's Thrush**. Op deze plek is een ringstation waar ringers de hele ochtend vangsten laten zien (we zagen *Grey Catbird* en *Chestnut-sided Warbler* voorbij komen) en waar de publieke paden langs de netten lopen (we zagen o.a. een *Scarlet Tanager* hangen) – uniek!

Tijdens de lunch naast een nabije food truck vergeleken we kekers en in het beeld van een willekeurig gemikte kijker liepen plots onze eerste **White-crowned Sparrows** (*Witkruingors*)... Hierna lonkte het kampeerterrein dat ons gisteren goed beviel en daar was het interessant om de soortensamenstelling met gisteren te vergelijken: nu waren er minder *Catbirds* en vooral *White-throated Sparrows* maar een hogere diversiteit aan zangers – we zaten middenin in de omschakeling van korte-afstandstrekken naar lange-afstandstrekken! Onze enige **Sharp-shinned Hawk** van de reis kwam langsknallen net nadat we de auto uitstapten en we zagen nog twee welkome nieuwe soorten: **Wood Thrush**, waarschijnlijk de mooiste van de oostelijke lijsters, en de subtiele, delicate **Lincoln's Sparrow**.



Lincoln's Sparrow (L) en Backus Woods (R), Long Point

Daarmee was het bijna tijd om de Long Point omgeving vaarwel te zeggen, maar niet voor een laatste bezoek aan Backus Woods. Hier was het rustig maar we kregen een **Pileated Woodpecker** goed te zien – wat een soort! Daarna was het een rit van zo'n twee uur naar de Rondeau omgeving, waar we de komende twee dagen zouden vogelen.

Dag 5 (11 mei): Rondeau

Vanochtend begonnen we niet ver van de zuidelijke punt van het Rondeau schiereiland, hopen op flinke aankomst van trekvogels na de goede resultaten op Long Point gister en nog beter klinkende berichten uit Pelee. Dit viel tegen en het was een heel rustig begin langs het South Point Trail, maar wel met twee prettige nieuwe soorten: een zingende **Yellow-throated Vireo** die zich ook goed liet zien en een overvliegende **Red-headed Woodpecker**. Laatstgenoemde hebben zo'n opvallend rood-zwart-wit kleed dat ze ook in vlucht prachtig kenmerkend zijn! Dit was onze zevende en laatst mogelijke spechtensoort.

We besloten om vrij snel andere paden te proberen. We waren nog maar een paar honderd meter aan het rijden toen ik beweging in een struikje naast de auto zag, wat een **Yellow-breasted Chat** bleek te zijn! De meeste van ons, maar helaas niet iedereen, konden de *Chat* in beeld krijgen voordat de vogel uit zicht verdween in een groter struikencomplex. Dit was onze enige waarneming van deze hier schaarse, zuidelijke soort die vroeger een warbler werd beschouwd maar nu in een eigen familie zit.

Op een pad nabij het bezoekers-centrum liet onze doelsoort **Prothonothary Warbler** zich al vlot horen. We liepen snel richting het geluid en konden aanschuiven bij een groepje vogelaars die deze schitterende vogel in beeld hadden. Hij liet zich fantastisch bekijken: ondanks dat 'ie erg mobiel was, was 'ie ook makkelijk te volgen, steeds vlak boven het water



♂ *Prothonotary Warbler*, Rondeau

foeragerend in een nogal open moerasbos. *Prothonothary Warbler* was erg gewild door onze groep en er waren brede glimlachen alom na deze waarneming. Het is de enige Noord-Amerikaanse warbler die in boomholten broedt en met name een karaktersoort van de moerasbossen in de zuidoostelijke Verenigde Staten – maar gelukkig komt 'ie hier nog net Canada binnen en broedt in Rondeau!

Tijdens het vogelen vlak langs het strand aan het eind van de ochtend zagen we onze eerste **Canada Warbler** en **Willow Flycatcher**. Langzaam werd duidelijk dat er uiteindelijk toch een prima diversiteit trekvogels aanwezig was vandaag – en voor het eerst hogere aantallen van soorten zoals **Eastern Kingbird**, **White-crowned Sparrow**, **Least Flycatcher**, **Yellow Warbler** en **Baltimore Oriole** (voor de twee laatstgenoemde was het de eerste van vijf opeenvolgende dagen met 50+ van elk!). Na lunch op het nabijgelegen kampeerterrein probeerden we een paar strandpaden voor **Hooded Warblers** en uiteindelijk vond Epie een prachtig mannetje voor ons. Ook genoten we van een **Red-headed Woodpecker** die vanuit een boomtop steeds vliegenvanger-achtige vluchten maakte om insecten te vangen – een heel leuk gezicht!

Om wat meer steltlopers te zien bezochten we de Blenheim Sewage Lagoons, met als hoogtepunt een fraai zomerkleed vrouwtje **Wilson's Phalarope** (*Grote Franjepoot*), een

schaarse soort in oostelijk Noord-Amerika. Ook zagen we nóg twee verdwaalde **Black-necked Stilts** (nee, die komen hier normaal echt niet voor...) en **Dunlins** (*Bonte Strandloper*), **Least Sandpipers** (*Kleinste Strandloper*) en **Lesser Yellowlegs** (*Kleine Geelpootruiter*). In de namiddag bracht het Erieau Rail Trail ons nog een nieuwe steltloper: **Semipalmated Plover**.

Na het avondeten was het tijd voor de enige avondexcursie van deze reis met een deel van de groep. Net als onze *Houtsnippen* baltsen **American Woodcocks** met name in de schemering, maar ze pakken het wel wat anders aan... Vanavond wierpen ze een werkelijk fantastische show op – goed zichtbaar vanaf de grond roepend, achter elkaar aan zittend, en veel



Wood Thrush, Rondeau

baltsvluchten makend! Tijdens deze baltsvluchten vliegen de vogels recht omhoog tot ze met het blote oog vrijwel niet meer zichtbaar zijn en maken ondertussen de gekste geluiden. Ook indrukwekkend was dat we minstens *neg*en individuen waarnamen. Hierna reden we wat rond met raampjes naar beneden en hoorden al snel een **Whip-poor-will**. We keken even of we deze nachtzwaluwsoort in beeld konden krijgen met een zaklamp, maar besloten vlot de handdoek in de ring te gooien na een heel mooie avond.

Dag 6 (12 mei): Rondeau – Point Pelee



♂ *Yellow Warbler, Rondeau*

De gedachte achter het plan voor vanochtend was iets in de hoek van “two birds with one stone”. We wouden zowel graag wat ontbrekende moerassoorten als meer trekkende zangvogels zien in die beste ochtenduren van de dag, en we hoopten dat het Rondeau Marsh Trail ons van allebei kon voorzien. Het staartje van een “morning flight” van o.a. warblers en Baltimore Orioles dat we hier meepikten was een indicatie dat er aankomst was geweest. In Nederland zouden we dit gewoon dagtrek noemen, maar

het verschilt iets: dit zijn nachttrekkers die ‘s ochtends vroeg heroriëntatie-vluchten ondernamen – en dan regelmatig in de “verkeerde” richting vliegen (in het voorjaar naar zuid en vice versa). Een leuk fenomeen maar het is wel lastig om details te zien aan de nogal snel overvliegende warblers, met name als je die allemaal net aan het leren bent.

We kwamen ook een aardige diversiteit warblers en andere zangvogels tegen aan de grond, met als onbetwiste hoogtepunt een **Grey-cheeked Thrush** (*Grijswangdwerglijster*) die vóór ons op het pad zat. Dit is de schaarse en laatst in het seizoen doortrekkende *Catharus*-lijsters. Ook leuk was een coöperatieve **Ruby-throated Hummingbird**. Langs een rietveld lopend vloog plots een heel klein reigertje naast ons op: een **Least Bittern**! De vogel dook snel terug het riet in maar uiteindelijk zagen we de kop uit het riet steken en konden die daarna goed in de telescoop bekijken. Super! Even verder reageerde een **Virginia Rail** op het afspelen van geluid. Het was hier door dicht struweel langs het pad lastig om zicht op de rand van het riet te krijgen en de eerste waarneming werd door bijna iedereen gemist. We gaven het al bijna op toen de vogel uiteindelijk -stilletjes!- heel dichtbij kwam en zelfs tweemaal het pad overstak, waarbij we 'm fantastisch konden bekijken!



Virginia Rail, Rondeau

Na een vroege lunch in het enige restaurantje in Rondeau gaf een melding van -weer- een Golden-winged Warbler ons een goed excuus een laatste nieuw pad in het park te bezoeken. Dit was helaas geen succes: in het warme, zonnige weer was er weinig activiteit en een paar honderd meter voor onze coördinaten werd het pad zodanig door omgevallen bomen geblokkeerd dat we besloten om te keren. Wel waren we blij met een **White-eyed Vireo**, nog zo'n zuidelijke soort die hier vrij schaars is.

Onze laatste stop in de Rondeau omgeving was in het McLean Conservation Area, waar **Clay-Colored Sparrows** waren gezien. Al snel hoorden we diens bizarre zang, een insect-achtige, mechanische buzz en kregen we de eerste van uiteindelijk drie individuen

in beeld. De ook aanwezige *Chipping Sparrows* zorgden voor goed vergelijkingsmateriaal. Wederom een subtiele maar erg aantrekkelijke gors en een nogal schaarse doortrekker – en hiermee hadden we alweer de laatste van de verwachte gorzen gezien!

De rit van Rondeau naar een goede **steltloperplek bij Point Pelee duurde door afgesloten wegen iets langer dan het geplande uur. Het gebied was vandaag niet spectaculair, maar we konden de** nieuwe soorten *White-rumped Sandpiper* (**Bonaparte's Strandloper**) en **Grey Plover** (Zilverplevier) bijschrijven. Zoals wel meer Amerikaanse stelten is eerstgenoemde schaarser in oostelijk Noord-Amerika dan je zou verwachten op basis van het voorkomen als dwaalgast in Europa. Het kleine bosje bij het parkeerterrein leek aardig vol te zitten met warblers, waaronder een fraaie **Bay-breasted Warbler**: een veelbelovend begin voor zangvogels in deze omgeving.

Een *Bell's Vireo*, een wat westelijkere soort die hier dwaalgast is, was eerder vandaag ontdekt door een Nederlandse (!) groep en dat leek een geschikte afsluiter van de dag. De vogel zat in struweel direct langs het strand en eenmaal aangekomen bewoog 'ie zich net buiten zicht. Vrijwel alle aanwezige vogelaars hielden het toen voor bekeken en we stonden er alleen voor... Maar er waren duidelijk vogels aangetrokken tot deze in avondlicht beschonken rand, zoals een prachtige man **Scarlet Tanager** – en na zo'n twintig minuten kregen we ook de **Bell's Vireo** ineens weer in beeld!



♂ *Scarlet Tanager, Point Pelee*

Dag 7 (13 mei): Point Pelee

Vandaag was onze eerste van drie volledige dagen in de Point Pelee omgeving. Door het park rijdend werd gelijk duidelijk dat er meer vogels waren dan de afgelopen dagen in Rondeau. We kwamen dan ook niet ver en maakten een impromptu stop omdat we **Tennessee Warblers** hoorden – een relatief late doortrekker en nog een nieuwe soort. We bleven uiteindelijk bijna twee uur hier op de paden hangen en het was genieten van de hoge aantallen warblers en andere zangvogels! *Tennessee Warblers* zijn makkelijker te horen dan te zien doordat ze graag hoog zitten en niet opvallend gekleurd zijn, maar al vrij snel kregen we er ook twee in beeld.

Maar er waren meer en “betere” nieuwe warblers in de aanbieding! Eerst zagen we een erg in de smaak vallend mannetje **Blackpoll Warbler**, nog zo’n late doortrekker die nog nieuw was. Het hoogtepunt was een **Blue-winged Warbler** – een heel fraaie en redelijk schaarse soort. Wel een soort waar we op rekenden, en omdat het alweer dag 7 van de reis was, was dit zo langzamerhand een heel welkome aanvulling. Zoals karakteristiek voor *Blue-winged Warblers* was de vogel erg beweeglijk en al vrij snel uit beeld, maar niet na zich even prima te hebben laten bekijken. Het leek er vanochtend op dat veel vogels zich langzaam voortbewogen over het schiereiland en nog geen stekkie voor de dag hadden uitgezocht – hierdoor bleven vele vogels niet lang zichtbaar, maar dit hield het vogelen wel heel dynamisch en spannend.



♂ Blackburnian Warbler, Point Pelee

Het was de vraag of we laat in de ochtend wel in de buurt van het bezoekerscentrum konden parkeren: het was in Point Pelee enorm druk met vogelaars. Dit was een groot verschil met Long Point en Rondeau, maar ook hoorden we van trouwe Pelee bezoekers dat ze het hier nog nooit zo druk hadden meegemaakt. Dit had waarschijnlijk veel te maken met twee jaar pauze door de pandemie. Op de drukke plekken hier hadden we dan ook vrijwel altijd andere vogelaars in zicht, maar een voordeel aan Point Pelee is dat er ontzettend veel paden zijn in een erg groot gebied, zodat het

altijd mogelijk is naar een rustiger stuk te gaan. Eenmaal bij het bezoekerscentrum aangekomen -het was inderdaad een stukje lopen vanaf de beschikbare parkeerplek- liepen we een pad op richting de punt van het schiereiland.

Hier bleven we veel vogels zien en met weer een heel mooi hoogtepunt: een vrouwtje **Golden-winged Warbler**! Ondanks een sterk verschillend kleed is deze soort nauw verwant aan *Blue-winged Warbler* maar is zeldzamer en gaat ook achteruit, onder ander door hybridisatie met de *Blue-winged*. Aan onze vogel zagen we gelukkig geen indicaties voor hybridisatie. Opmerkelijk is dat sommige hybriden tussen deze soorten oorspronkelijk als niet één maar twee verschillende soorten waren beschreven: de “*Brewster’s Warbler*” en




Red-headed Woodpecker, Point Pelee

de “*Lawrence’s Warbler*”. Die soorten worden niet langer erkend maar vogelaars gebruiken deze namen nog steeds om naar vogels met bepaalde kleden te verwijzen.

Wederom waren er nieuwe warblers: een **Wilson’s Warbler** (het zwarte petje van het mannetje is o zo leuk), een gehoorde **Northern Waterthrush** en twee van ons zagen een **Mourning Warbler**. Laatstgenoemde is een schaarse en gewilde skulker waar we gelukkig morgen meer van zouden zien. Wat een dag voor warblers, dachten we – maar wacht op morgen! Na lunch bij het bezoekerscentrum bleven we de paden in het park aflopen, met als nieuwe soorten **Broad-winged Hawk** en eindelijk de gehoopte **Philadelphia Vireo**, onze zevende en laatst mogelijke vireo.

Het was een vogelrijke dag geweest! Vandaag bleek onze beste dag voor **White-crowned** (ca. 40) en **Lincoln’s Sparrows** (8). Deze twee gorzen trekken later door dan de nu grotendeels verdwenen **White-throated Sparrows**, waarvan we vandaag onze laatste zagen. Ook hadden we onze hoogste aantallen van bijvoorbeeld **Magnolia** (ca. 35) en **Bay-breasted** (ca. 40) **Warbler** en **Rose-breasted Grosbeak** (ca. 30).

Dag 8 (14 mei): Point Pelee



*Vlakbij de punt van Point Pelee.
Inmiddels was de omgeving aardig groen geworden,
maar de onbeschutte punt liep ver achter!*

Voor vandaag stond verreweg de vroegste start van de reis op het programma: rond kwart over vijf verlieten we het hotel. Wel na ontbijt en koffie, want ons hotel had vroeg vogelaarsontbijt! Vanaf het bezoekers-centrum was het een korte rit in het “trammetje” (een kleine, elektrische bus) dichterbij de zuidelijke punt van het schiereiland, waar we al net voor zonsopkomst om 6 uur aan-kwamen. Veel geharde Pelee-vogelaars doen dit elke ochtend om de morning flight te bekijken – dit levert vaak dwaalgasten op. De punt van Point Pelee zelf is een zanderige landtong die zuidelijk Lake Erie insteekt, maar momenteel door erosie door recente stormen heel miniem is!

Door deze erosie stonden we wat hutje-mutje met andere vogelaars vlak voor de punt – vogelaars lopen de zandpunt zelf niet op omdat daar vaak meeuwen en sterns landen. Zo ook nu: we zagen een leuke groep **Bonaparte’s Gulls** (*Kleine Kokmeeuw*) met een eerste-zomer **Little Gull** (*Dwergmeeuw*). Het uitzicht vanaf de punt is fraai met Lake Erie aan alle kanten en met in zuidwestelijke richting Pelee Island en vandaag ook donkere wolken. De morning flight van zangvogels was hoog en het leek niet om grote aantallen te gaan (wel was het leuk om bijvoorbeeld een paar hoog vliegende **Blue Jays** te zien). Daarom gingen we vrij snel de paden op om heel rustig vogelend terug richting bezoekerscentrum te lopen.

Vrijwel meteen zagen we hier een langverwachte **Yellow-bellied Flycatcher** (de eerste van 8 vandaag!), de schaarsere en later doortrekkende tegenhanger van de *Least Flycatcher*. Na vele dagen eindeloze zonneshijn haalden die donkere wolken ons in en kregen we de eerste neerslag van de reis, maar dit bleef bij een uurtje af en aan lichte regen. We bleven uiteindelijk bijna de hele dag in deze omgeving rondlopen, met een lunchpauze bij het bezoekerscentrum, en keerden pas aan het einde van de middag terug naar ons busje.



♀ *Cerulean Warbler, Point Pelee*

Een hoogtepunt was de laatste nieuwe warbler van de trip: **Cerulean Warbler**! Deze zagen we vlakbij waar we gister die andere top-warbler zagen, de *Golden-winged Warbler*. Dat het “helaas” een vrouwtje was mocht de pret niet veel drukken en waarschijnlijk ging het zelfs om twee vogels – een half uur na de eerste waarneming en ruim 100 meter verderop merkte Huig er scherp één op. Dit plekje kon voor ons sowieso al niet meer stuk, maar we zagen er vlak na de *Ceruleans* ook een **Yellow-billed Cuckoo** en een fraaie **Mourning Warbler** – deze werd wél door iedereen werd gezien. Fantastisch! Later op de dag mochten we ook gelijk die andere mogelijke

Cuckoo bijschrijven: een **Black-billed Cuckoo**. Aan het eind van de middag hoopten we tevergeefs op een zichtwaarneming van *Marsh Wren* langs het Marsh Boardwalk.

Al met al was het vandaag onze beste dag voor warblers met maar liefst 25 soorten! De diversiteit was indrukwekkender dan de kwantiteit, maar we zagen bijvoorbeeld onze hoogste aantallen van **American Redstart**, **Black-throated Green**, **Chestnut-sided** (ca. 15 elk), **Tennessee** (ca. 10) en **Black-throated Blue** (8) **Warbler**, en **Red-eyed** (ca. 15) en **Philadelphia** (11!) **Vireos**. Daarentegen waren de vroeger doortrekkende **Yellow-rumped Warblers** nu bijna geheel verdwenen en zagen we vandaag de laatste van de reis.



♂ *Mourning Warbler, Point Pelee*



♂ *Chestnut-sided Warbler (L) en Philadelphia Vireo (R), Point Pelee*

Dag 9 (15 mei): Lake St. Clair – Point Pelee

Dit was alweer de laatste volle vogeldag van de reis! Na een paar uitstekende dagen in Point Pelee waren de mogelijkheden voor nieuwe trekvogelsoorten daar ineens heel beperkt en besloten we naar de omgeving van Lake St. Clair te gaan, ruim een uur naar het noorden. Hier bevindt zich onder andere de meest oostelijke broedplek van de *Yellow-headed Blackbird* (*Geelkoptroepiaal*).

De eerste stop was *St. Clair NWA*, een moerasgebied voor een herkansing op een zichtwaarneming van **Marsh Wren**. Al snel hoorden we een aantal en één daarvan liet zich al zingend vanuit de top van een rietstengel goed bekijken. Succes! Ook was het leuk om de gekke, lage baltsroep van de **Least Bittern** hier te horen.

Opgetogen reden we door naar een weggetje dat uitkomt direct aan Lake St. Clair. Een tijdlang speuren over het moeras aan de rand van het meer leverde voor ons nieuwe **Forster's Terns** (*Forster's Stern*) en **Black-crowned Night-herons** (*Kwak*), maar een snelle fly-by van onze doelsoort **Yellow-headed Blackbird** werd door de meesten gemist. Iets verderop vonden we een zingend mannetje (wat een bizar geluid!) maar ook die liet zich maar aan enkelen van ons zien... Het kwam allemaal toch nog goed nadat Epie met een man sprak die ons uitnodigde in zijn huis. Vanuit de woonkamer van dit huis, met extreem vriendelijke bewoners, konden we een vrouwtje prima bekijken. Hiermee was de koek nog niet op want even later stonden we naar roestende **Great Horned Owls** aan de rand van een bosje te kijken – één volwassen en twee jonge vogels! Een imposante soort die aardig op onze *Oehoe* lijkt.



Great Horned Owl, Lake St. Clair

In Wheatley Harbor waren al een tijdje af en aan waarnemingen van een eerste-zomer **Iceland Gull** (*Kleine Burgemeester*). Dit betrof de hier meest algemene *kumlieni* ondersoort (ook wel "*Kumlien's Meeuw*") en gelukkig was de vogel aanwezig toen wij hier even langsgingen. Al bijna tegen het einde van de middag gingen we eindelijk het Pelee park weer binnen, waar het weer onderhoudend vogelen was – maar het was nu inderdaad lastig om nog nieuwe dingen te zien. Leuke waren 3 **Canada Warblers** binnen een kort tijdbestek en eindelijk kregen we de **Mississippi Kite** te zien die al dagenlang af en aan overvliegend in het park werd waargenomen. Een mooie waarneming was het helaas niet: we zagen de vogel plotseling op afstand bovenin een dode boom en terwijl we de telescopen klaarzetten vloog 'ie alweer uit zicht. Toch een leuke bonus en afsluiter van deze dag!

Dag 10 (16 mei): Pelee – Mosa Forest – Toronto – Amsterdam (+1)



♂ Orchard Oriole, Point Pelee

We begonnen deze laatste dag van de reis weer in het Pelee park, omdat flink wat regen in de vroege ochtend de hoop deed oplaaien dat er een “fall” zou kunnen zijn. Al snel werd duidelijk dat dit niet het geval was en het was wellicht zelfs rustiger dan de afgelopen dagen. *Catharus*-lijsters waren wel vrij opvallend aanwezig en met name onverwachts was een late **Hermit Thrush**. Aangezien we meerdere alternatieve bestemmingen langs de route terug naar Toronto op het oog hadden, reden we al vrij snel het park weer uit.

Een tweede bezoek aan Hillman Marsh, het nabijgelegen steltlopergebied, leek ook de moeite waard vanwege de regen. Zouden er horden stelten uit de lucht zijn gevallen? Weer was het antwoord “neen”, maar toch waren er meer steltlopers dan tijdens het eerste bezoek waaronder **Semipalmated Sandpiper** (*Grijze Strandloper*) en een groep **Short-billed Dowitchers**. We zagen ook een vogel die er goed uit leek te zien voor **American Black Duck** maar die we uiteindelijk toch als hybride **Mallard x Black Duck** bestempelden. Het hoogtepunt was een paartje **Trumpeter Swans** dat kwam aanvliegen, eventjes hard met boze **Canada Geese** (*Canadeze Gans*) met jongen knokte en daarna begon te baltsen en roepen! Na vrijwel dagelijkse **Mute Swans** (*Knobbelzwaan*) was dit pas de eerste inheemse zwanensoort die we zagen.



Trumpeter Swans, Hillman Marsh




Acadian Flycatcher, Mosa Forest

Hierna was het een stuk rijden naar de tweede tussenstop, het Mosa Forest. Deze plek had ik achter de hand gehouden voor een uitgebreider bezoek, aangezien hier bijvoorbeeld ook *Cerulean Warbler* broedt. Door onze eerdere resultaten was de enige mogelijkheid voor een nieuwe soort hier nu **Acadian Flycatcher**. Die hoopten we ook tijdens een bezoekje midden op de dag wel te kunnen vinden en al snel hadden we er inderdaad één in beeld. Ondanks het korte bezoek was het leuk om alle vogelzang te horen in dit loofbos met een vergelijkbaar karakter als Backus Woods – maar inmiddels waren alle Neotropische

trekvoegels aangekomen. **Hooded Warblers**, **Red-eyed Vireos** en **Indigo Buntings** zongen volop en ook hoorden we **Ovenbird**, **Pine** en **Blue-winged Warbler**. Vlak buiten het bos werd een **Horned Lark** (*Strandleeuwerik*) die zich goed liet bekijken erg op prijs gesteld. Een soort die natuurlijk ook in Nederland voorkomt, maar het is leuk om 'm ook op dit continent te zien waar diens ecologie behoorlijk anders is: hier in het oosten is het een akkervogel.

De allerlaatste stop van de reis was voor een soort waar we met name in Rondeau op gehoopt hadden, maar daar nooit zagen of zelfs maar hoorden – de **Tufted Titmouse**. Een parkje in Brantford, Gilkison Flats, moest het daarom gaan worden voor deze soort. Een leuke mixed-flock met ook een aantal doortrekkende warblers gaven er twee prijs en daar waren we heel blij mee!



Gilkison Flats in Brantford

Hierna was het nog een uurtje rijden naar het vliegveld. Het verkeer kan erg dichtzitten rond Toronto, met name zoals nu in de midweek, dus namen we het zekere voor het onzekere. Doordat we uiteindelijk helemaal geen vertraging hadden waren we al meer dan vier uur voor de vlucht op het vliegveld. Hier zette ik de deelnemers af voor de vlucht terug naar Amsterdam. Helaas werd door wat vertraging de overstap in Kopenhagen gemist, maar het bleef bij een paar uur vertraging.

Nawoord

Tijdens deze tiendaagse reis bezochten we de Niagara Falls watervallen en drie van de beroemde Canadeze gebieden voor zangvogeltrek aan Lake Erie: van oost naar west, Long Point, Rondeau en Point Pelee. Op alle drie de plekken waren trekvoegels behoorlijk evident maar qua aantallen pakte Point Pelee verreweg het beste uit voor ons. Gelet op berichten van andere vogelaars lijkt het er op dat Point Pelee tijdens de gehele duur van deze reis aanzienlijk voller zat dan de twee oostelijkere “migrant traps”. Deels is dat ook te verwachten dankzij de ligging van Point Pelee aan de nauwere westkant van het meer -waar meer vogels oversteken- en de meer extreme geografie, maar dit voorjaar leek het verschil nogal uitgesproken. Deze prima aantallen niettegenstaande mochten wij een echte “fall” niet meemaken – een fall of in ieder geval een erg grote aankomst op Point Pelee op 9 mei was beduidend minder intens op Long Point, waar wij toen zaten.

Weersomstandigheden zijn een grote factor tijdens een reis als deze. De grootste vrees in het voorjaar is voor een periode met aanhoudende noordenwind waarbij de trek stil ligt. Al met al troffen wij het, maar we hadden eerder het omgekeerde probleem: aanhoudende uitstekende weersomstandigheden voor trek. De meeste dagen hadden we meer dan 10 uur zonneschijn en heel weinig wind, maar met een zuidelijke stroming. Het was doorgaans erg prettig om buiten te zijn al waren sommige middagen aan de warme kant, wat duidelijk een drukkend effect had op de vogelactiviteit.

Het was ietwat paradoxaal dat het ondanks dit deze weersomstandigheden nog wel een laat voorjaar was tijdens ons bezoek: tot vlak voor ons bezoek was het langdurig vrij koud geweest. Onze late eerste waarnemingen van *Chimney Swifts* (11 mei), *Eastern Wood-Pewee* (12 mei), en *Red-eyed Vireo* (13 mei) waren de meest opvallende tekenen van het

late voorjaar. Gelukkig leidde dit niet tot echte missers maar het was bijvoorbeeld jammer dat er in Backus Woods nog weinig lange-afstandstrekkingen waren rond 9 mei.

Qua trekvogels zagen we behalve zangvogels ook 16 soorten steltlopers en 18 soorten eenden (waarvan de meesten dus niet lokaal broeden) en soorten als *Common Loon*. Naast trekvogels hebben we ook hard ons best gedaan om lokale broedvogels mee te pakken, wat echt uitstekend gelukt is! Er waren vele hoogtepunten en de volgende soorten hebben we stuk voor stuk prima te zien gekregen: *Virginia Rail*, *Sora*, *Least* en *American Bittern*, *Sandhill Crane*, *Upland Sandpiper*, *American Woodcock*, zeven soorten spechten, *Eastern Screech-Owl* en *Great Horned Owl*, *Tufted Titmouse*, *Bobolink*, *Yellow-headed Blackbird*, *Vesper Sparrow*, *Pine Warbler* en *Louisiana Waterthrush*.

Zo midden in de trektijd en met veel andere vogelaars in de omgeving liggen dwaalgasten op de loer. Zelf ontdekten we geen maar wel zagen we eerdere ontdekte *Black-necked Stilts*, een *Mississippi Kite* en een *Bell's Vireo*. Andere bijschrijfsoorten waren o.a. nog aanwezige winter-/vroeg voorjaarsgasten zoals *Rusty Blackbird*, *White-winged Scoter* and *Iceland Gull*. Tijdens een reis als deze is ook een lange lijst zeer schaarse doortrekkers en zuidelijke overschieters mogelijk. Gezien de aanhoudende stroming helemaal uit het zuiden van het continent kwam had ik eigenlijk meer overschieters verwacht: wij zagen geen van de regelmatige overschieters *Prairie*, *Worm-eating*, *Yellow-throated* en *Kentucky Warbler*, *Blue Grosbeak* en *Summer Tanager*. Tot slot zijn er in deze regio twee soorten waar iedereen naar zoekt: *Kirtland's Warbler* en *Connecticut Warbler*. Ondanks de wat vroege data voor *Connecticut* en de zeldzaamheid van *Kirtland's* (maar ze nemen toe!) was het opvallend dat er geen waarnemingen waren tijdens ons verblijf.

Tot slot hadden we héél weinig echte missers – eindelijk alleen noemenswaardig zijn *Hooded Merganser*, *Common Nighthawk* en dat we *Orange-crowned Warbler* niet als 30^e warblersoort zagen. De teller bleef op 29 steken! :)

Jelmer Poelstra – juni 2022



♂ *Common Yellowthroat*, Marsh Boardwalk, Point Pelee



♂ *Wilson's Warbler, Point Pelee*



♀ *Canada Warbler, Point Pelee (14 mei)*



♂ *Magnolia Warbler, Point Pelee (13 mei)*



♀ *Northern Parula, Point Pelee (13 mei)*



♀ *Rose-breasted Grosbeak, Point Pelee (14 mei)*



♂ *Indigo Bunting, Point Pelee (13 mei)*



White-crowned Sparrow, Point Pelee (13 mei)




♀ *Black-throated Blue Warbler, Point Pelee (15 mei)*



Iceland Gull (kumlien), Wheatley Harbor (15 mei)



Hermit Thrush, Point Pelee (16 mei)



Redbud Footpath, Point Pelee (13 mei)
Langs dit pad zagen we o.a. Golden-winged,
Cerulean en Mourning Warbler!



American Bitterns, Big Creek Marsh, Long Point (9 mei)

Soortenlijst

Net als in het verslag zelf worden Nederlandse namen genoemd voor soorten die in Nederland zijn vastgesteld.

1. **Canada Goose** (Canadese Gans, *Branta canadensis canadensis*)
Een algemene soort die we op 9 van de 10 dagen zagen, meestal enkele tientallen en max. ca. 50 exx. op een dag.
2. **Trumpeter Swan** (*Cygnus buccinator*)
Een paartje op de laatste dag in Hillman Marsh – een indrukwekkende zwaan met een waanzinnig geluid. Deze soort is recent in de regio geïntroduceerd. De andere inheemse zwanensoort, *Tundra Swan* (*Fluitzwaan*), is helaas in mei al ruim naar het noorden vertrokken.
3. **Wood Duck** (*Aix sponsa*)
Op maar liefst 8 van de 10 dagen waargenomen met max. 12 exx. op één dag. Een broedvogel in de omgeving.
4. **Blue-winged Teal** (Blauwvleugeltaling, *Spatula discors*)
2 exx. bij Backus Woods op 8 mei, 3 exx. op in de Blenheim Sewage Lagoons op 11 mei, en 4 exx. in Hillman Marsh op 16 mei. Voornamelijk een doortrekker.
5. **Northern Shoveler** (Slobeend, *Spatula clypeata*)
20 exx. bij Birds Canada HQ in Long Point op 8 mei en 1 in de Blenheim Sewage Lagoons op 11 mei. Ook een aantal voor ons heel bekende eenden komen hier voor, waaronder de *Slobeend*, *Krakeend*, *Pijlstaart* (niet gezien deze reis), *Wilde Eend*, *Topper*, *IJseend*, *Grote* en *Middelste Zaagbek*! Opmerkelijk genoeg heeft slechts één van deze soorten een andere ondersoort in N-Amerika dan in Europa: Grote Zaagbek.
6. **Gadwall** (Krakeend, *Mareca strepera*)
4 exx. op 12 mei en 5 exx. op 16 mei in Hillman Marsh by Point Pelee.
7. **American Wigeon** (Amerikaanse Smient, *Mareca americana*)
Op 4 dagen waargenomen met max. 20 exx. op één dag. De meeste eendensoorten die we zagen broeden niet of zeer lokaal in deze omgeving maar overwinteren en komen vooral op trek in grote aantallen voor – maar deze trek is met name in maart-april. We moesten het dus veelal van achterblijvers hebben en boekten een prima resultaat met 18 soorten eenden!
8. **Mallard** (Wilde Eend, *Anas platyrhynchos*)
Op 9 dagen waargenomen met max. ca. 15 exx. op één dag.
9. **Green-winged Teal** (Amerikaanse Wintertaling, *Anas carolinensis*)
7 exx. bij Birds Canada HQ in Long Point op 8 mei.
10. **Canvasback** (*Aythya valisineria*)
1 ex. bij Birds Canada HQ in Long Point op 8 mei en 2 exx. langs het Erieau Rail Trail bij Rondeau, allen mannetjes. We hadden geluk dat er nog een paar individuen van deze soort aanwezig waren.
11. **Redhead** (Amerikaanse Tafeleend, *Aythya americana*)
5 exx. bij Birds Canada HQ in Long Point op 8 mei.
12. **Ring-necked Duck** (Ringsnaveleend, *Aythya collaris*)
4 exx. in het Port Rowan Wetland bij Long Point op 9 mei en 1 ex. bij de punt van Point Pelee op 14 mei.
13. **Greater Scaup** (Topper, *Aythya marila*)
2 exx. bij Birds Canada HQ in Long Point op 8 mei en 1 ex. langs het Erieau Rail Trail bij Rondeau op 11 mei. In het binnenland in oostelijk Noord-Amerika is *Greater Scaup* een stuk schaarser dan *Lesser Scaup*, maar op deze reis liepen de aantallen niet veel uiteen.
14. **Lesser Scaup** (Kleine Topper, *Aythya affinis*)
7 exx. bij Birds Canada HQ in Long Point op 8 mei en 5 exx. langs het Rondeau Marsh Trail op 11 mei.

15. **Bufflehead** (Buffelkopeend, *Bucephala albeola*)
Ca. 15 exx. in het Port Rowan Wetland bij Long Point op 9 mei en 4 exx. langs het Rondeau Marsh Trail op 11 mei.
16. **Common Merganser** (Grote Zaagbek, *Mergus merganser americanus*)
1 mannetje langs het Rondeau Marsh Trail op 11 mei.
17. **Red-breasted Merganser** (Middelste Zaagbek, *Mergus serrator*)
Op 4 dagen waargenomen met max. ca. 40 exx. op één dag.
18. **Long-tailed Duck** (IJseend, *Clangula hyemalis*)
2 exx. op Lake Ontario vanaf het Forty Mile Creek Park op 7 mei.
19. **White-winged Scoter** (*Melanitta deglandi*)
Ca. 150 exx. op Lake Ontario gezien vanaf het Forty Mile Creek Park op 7 mei. Recentelijk gesplit van de Europese (*Velvet Scoter*, *Grote Zee-eend*) en Aziatische (*Stejneger's Scoter*) tegenhangers.
20. **Ruddy Duck** (*Oxyura jamaicensis*)
Ca. 40 exx. bij Birds Canada HQ in Long Point op 8 mei, en ca. 10 exx. in de Blenheim Sewage Lagoons op 11 mei.
21. **Wild Turkey** (*Meleagris gallopavo*)
Op 5 dagen waargenomen met max. 4 exx. op één dag. Met name gezien in Point Pelee.
22. **Pied-billed Grebe** (Dikbekfuut, *Podilymbus podiceps*)
1 ex. in Big Creek Marsh in Long Point op 10 mei en 1 ex. in St. Clair NWA op 15 mei.
23. **Mourning Dove** (*Zenaida macroura*)
Elke dag waargenomen met max. ca. 50 exx. op één dag.
24. **Yellow-billed Cuckoo** (*Coccyzus americanus*)
1 ex. op 14 mei in Point Pelee.
25. **Black-billed Cuckoo** (*Coccyzus erythrophthalmus*)
1 ex. op 14 mei in Point Pelee. De beide lokale koekoeken, met name Black-billed, komen pas laat in het seizoen aan. Toch was het ietwat opvallend dat we slechts twee individuen zagen (of hoorden!) – maar aangezien dit wel meteen redelijke waarnemingen van allebei de soorten opleverden, klaagden we niet te veel.
26. **Eastern Whip-poor-will** (*Antrostomus vociferus*)
1 ex. alleen gehoord in Rondeau op 11 mei. De enige nachtzwaluwsoort van de reis: ietwat opvallend dat we geen *Common Nighthawk* zagen.
27. **Chimney Swift** (*Chaetura pelagica*)
Pas op 11 mei (dag 5 van de reis) voor het eerst gezien, de soort was laat terug dit jaar! Daarna dagelijks maar nooit in grote aantallen, max. ca. 15 op één dag.
28. **Ruby-throated Hummingbird** (*Archilochus colubris*)
Op 6 dagen gezien met max. 6 exx. op één dag.
29. **Virginia Rail** (*Rallus limicola*)
1 ex. heel mooi gezien (en gehoord) langs het Rondeau Marsh Trail op 12 mei.
30. **Sora** (*Porzana carolina*)
1 ex. heel mooi gezien (en gehoord) in Big Creek Marsh in Long Point op 10 mei, en 1 ex. gezien en gehoord langs het Rondeau Marsh Trail op 12 mei.
31. **Common Gallinule** (*Gallinula galeata cachinnans*)
3 exx. in Big Creek Marsh in Long Point op 10 mei, 2 exx. in St. Clair NWA op 15 mei. Vrij recentelijk gesplit van onze *Waterhoen* (*Common Moorhen*).
32. **American Coot** (*Fulica americana americana*)
4 exx. in Big Creek Marsh in Long Point op 10 mei, 2 exx. in St. Clair NWA op 15 mei.

33. **Sandhill Crane** (Canadese Kraanvogel, *Antigone canadensis tabida*)
Op 5 dagen gezien met max. 4 exx. op één dag.
34. **Grey Plover** (Zilverplevier, US: Black-bellied Plover, *Pluvialis squatarola cynosurae*)
Ca. 45 exx. in Hillman Marsh op 12 mei, ca. 40 exx. in Wheatley Harbor op 14 mei, 7 exx. in Hillman Marsh op 16 mei. Dit is een andere ondersoort dan die in Europa. Een van de in totaal 16 soorten steltlopers die op deze reis zagen. Een aantal goed mogelijke soorten die we op niet tegenkwamen: *American Golden-Plover* (Am. Goudplevier), *Sanderling* (*Drieteenstrandloper*), *Pectoral Sandpiper* (*Gestreepte Strandloper* – heel algemeen maar trekt m.n. eerder in het seizoen), *Wilson's Snipe*, (*Western*) *Willet* en *Hudsonian Whimbrel* (trekt m.n. later in het seizoen).
35. **Semipalmated Plover** (*Charadrius semipalmatus*)
Op 5 dagen waargenomen met max. ca. 20 exx. op één dag.
36. **Killdeer** (Killdeerplevier, *Charadrius vociferus*)
Op 9 dagen waargenomen met max. ca. 20 exx. op één dag. Een algemene broedvogel in de omgeving.
37. **Black-necked Stilt** (*Himantopus mexicanus*)
1 ex. bij Long Point op 9 mei, 2 exx. in Blenheim Sewage Lagoons op 11 mei. Lokaal een dwaalgast, ook al broedt de soort niet ver weg met bv. een paar paartjes in NW Ohio.
38. **Ruddy Turnstone** (Steenloper, *Arenaria interpres morinella*)
Ca. 15 exx. (mooi in zomerkleed!) in Wheatley Harbor op 15 mei.
39. **Dunlin** (Bonte Strandloper, *Calidris alpina hudsonia*)
Op 4 dagen waargenomen met max. ca. 75 exx. op één dag. Dit is een andere ondersoort dan die Europa met vaak een opvallend langere snavel.
40. **Least Sandpiper** (Kleinste Strandloper, *Calidris minuta*)
Op 4 dagen waargenomen met max. ca. 15 exx. op één dag.
41. **White-rumped Sandpiper** (Bonaparte's Strandloper, *Calidris fuscicollis*)
2 exx. op 12 mei en 1 ex. op 16 mei in Hillman Marsh. Lokaal een schaarse doortrekker die pas eind mei piekt.
42. **Semipalmated Sandpiper** (Grijze Strandloper, *Calidris pusilla*)
1 ex. in Hillman Marsh op 16 mei. Ook een late doortrekker die pas eind mei piekt.
43. **Short-billed Dowitcher** (*Limnodromus griseus hendersoni*)
30 exx. in een ondergelopen weiland vlakbij Point Pelee op 14 mei, en ca. 35 exx. in Hillman Marsh op 16 mei. Zowel de oostelijke *griseus* ondersoort als de centrale *hendersoni* ondersoort is hier mogelijkheid: onze vogels waren behoorlijk rood van onder en daarmee grotendeels of allemaal *hendersoni*.
44. **American Woodcock** (*Scolopax minor*)
9 exx. baltsend in Rondeau op 11 mei – een fantastische ervaring!
45. **Wilson's Phalarope** (Grote Franjepoot, *Phalaropus tricolor*)
1 zomerkleed vrouwtje in Blenheim Sewage Lagoons op 11 mei. Een schaarse soort in oostelijk Noord-Amerika.
46. **Spotted Sandpiper** (Amerikaanse Oeverloper, *Actitis macularis*)
Op 4 dagen waargenomen met max. 3 exx. op één dag.
47. **Solitary Sandpiper** (Amerikaanse Bosruiter, *Tringa solitaria*)
1 ex. nabij Hagersville op 8 mei – een langsvliegende vogel die niet door iedereen werd gezien. Ondanks dat dit een relatief vroege doortrekker is was het opvallend dat we niet meer Solitaires zagen deze reis!
48. **Lesser Yellowlegs** (Kleine Geelpootruiter, *Tringa flavipes*)
Op 4 dagen waargenomen met max. ca. 10 exx. op één dag.

49. **Upland Sandpiper** (Bartram's Ruiter, *Bartramia longicauda*)
1 ex. nabij Hagersville op 8 mei, baltsend. De baltsroep en -vlucht doet wat aan Wulp denken!
50. **Little Gull** (Dwergmeeuw, *Hydrocoloeus minutus*)
1 1^e zomer op de punt van Point Pelee op 14 mei. Deze van oorsprong Europese soort is de afgelopen decennia snel toegenomen in oostelijk Noord-Amerika!
51. **Bonaparte's Gull** (Kleine Kokmeeuw, *Chroicocephalus philadelphia*)
Op 4 dagen waargenomen met max. ca. 40 exx. op één dag. Een heel sierlijke meeuw waar je nooit genoeg van krijgt!
52. **Ring-billed Gull** (Ringsnavelmeeuw, *Larus delawarensis*)
Elke dag waargenomen met max. ca. 5.000 exx. (een zeer ruwe schatting!) op één dag.
53. **Iceland Gull** (Kleine Burgemeester / Kumlien's Meeuw, *Larus glaucooides kumlieni*)
1 1^e zomer in Wheatley Harbor op 15 mei. Net als in Europa zijn burgemeesters doorgaans in mei al veel verder noordelijk, maar deze achterblijver werd hier af en aan gezien de laatste weken.
54. **American Herring Gull** (*Larus smithsonianus*)
Op 4 dagen waargenomen met max. ca. 50 exx. op één dag.
55. **Greater Black-backed Gull** (Grote Mantelmeeuw, *Larus marinus*)
1 adult bij Erieau op 12 mei. Een monotypische soort en dit is dus geen andere ondersoort dan in Europa.
56. **Caspian Tern** (Reuzenster, *Hydroprogne caspia*)
Op 4 dagen waargenomen met max. ca. 250 exx. op één dag. Een monotypische soort en dit is dus geen andere ondersoort dan in Europa.
57. **Black Tern** ((Amerikaanse) Zwarte Stern, *Chlidonias niger surinamensis*)
Op 6 dagen waargenomen met max. 7 exx. op één dag. Een andere ondersoort dan in Europa die ook in sommige kleden in het veld herkenbaar is.
58. **Common Tern** (Visdief, *Sterna hirundo hirundo*)
Ca. 50 exx. langs de Niagara River op 6 mei. Dit is dezelfde ondersoort als in Europa.
59. **Forster's Tern** (Forster's Stern, *Sterna forsteri*)
Ca. 15 exx. bij Lake St. Clair op 15 mei. In zomerkleed is deze soort veel minder kenmerkend dan in winterkleed, maar ze zijn bv. doorgaans opvallend witter dan Visdiefjes.
60. **Common Loon** (IJsduiker, *Gavia immer*)
1 adult zomerkleed in Port Rowan Wetland op 9 mei. Opvallend dat we slechts één zagen, maar deze vogel liet zich gelukkig heel goed bekijken.
61. **Double-crested Cormorant** (*Nannopterum auritum*)
Elke dag gezien met max. ca. 750 exx. op één dag.
62. **American Bittern** (*Botaurus lentiginosus*)
3 exx. in Big Creek Marsh op 9 mei – alleen in vlucht gezien maar wel heel langdurig rondvliegend!
63. **Least Bittern** (*Ixobrychus exilis*)
1 ex. langs het Rondeau Marsh Trail op 12 mei, 1 ex. roepend in St. Clair NWA op 15 mei, en 1 ex. roepend bij Lake St. Clair op 15 mei.
64. **Great Blue Heron** (*Ardea herodias*)
Op 8 dagen waargenomen met max. 4 exx. op één dag.
65. **Great Egret** (Grote Zilverreiger, *Ardea alba egretta*)
1 ex. te Niagara Falls op 7 mei, ca. 25 exx. bij Lake St. Clair op 15 mei. De Amerikaanse ondersoort is een mogelijke toekomstige split van het taxon in de Oude Wereld.
66. **Green Heron** (Groene Reiger, *Butorides virescens*)
Op 4 dagen waargenomen met max. 3 exx. op één dag.

67. **Black-crowned Night-Heron** (*Nycticorax nycticorax hoactli*)
2 exx. bij Lake St. Clair op 15 mei. Dit is een andere ondersoort dan in Europa.
68. **Turkey Vulture** (*Cathartes aura*)
Elke dag gezien met max. ca. 50 exx. op één dag. Een heel algemene soort – en ook doordat deze omgeving relatief roofvogelarm is, blijkt bijna elke grote zwevende vogel een Turkey Vulture te zijn... *Black Vulture* komt in heel kleine aantallen voor in de Niagara Falls regio en zagen we daar niet.
69. **Western Osprey** (*Visarend*, *Pandion haliaetus carolinensis*)
Op 3 dagen waargenomen met max. 2 exx. op één dag. Na een recente split is dit nog steeds dezelfde soort Visarend maar wel een andere ondersoort dan in Europa.
70. **Northern Harrier** (*Circus hudsonius*)
1 vrouwtje overvliegend (en door niet iedereen gezien) in Long Point op 10 mei, en een coöperatiever adult mannetje in Hillman Marsh op 16 mei. Een split van onze *Blauwe Kiek* die soms “Marsh Hawk” wordt genoemd, en de bijnaam van een adult mannetje is het evocatieve “Grey Ghost”.
71. **Sharp-shinned Hawk** (*Accipiter striatus velox*)
1 ex. langsvliegend op 10 mei in Long Point.
72. **Cooper's Hawk** (*Accipiter cooperii*)
1 ex. in Point Pelee op 13 en op 15 mei. Opvallend weinig *Accipiters* deze reis.
73. **Bald Eagle** (*Haliaeetus leucocephalus*)
Op 4 dagen werd 1 ex. gezien. Het thema van relatief weinig roofvogels op deze reis goldt helaas ook voor deze soort, die zeer sterk is toegenomen (teruggekrabbeld) in de afgelopen decennia.
74. **Broad-winged Hawk** (*Buteo platypterus*)
Regelmatig waargenomen in Point Pelee met 7 exx. op 13 mei, 3 exx. op 14 mei en 1 ex. op 15 mei. We zagen zowel de fraaie adulte vogels als de verwarrend veel op *Red-shouldered Hawk* lijkende tweedejaars vogels.
75. **Red-tailed Hawk** (*Buteo jamaicensis borealis*)
Op 6 dagen waargenomen met max. 5 exx. op één dag.
76. **Mississippi Kite** (*Ictinia mississippiensis*)
1 ex. in Point Pelee op 15 mei. Een zuidelijke soort die hier dwaalgast is; 1-2 individuen werden regelmatig overvliegend gemeld in Point Pelee tijdens onze dagen daar. We hadden besloten hier niet achter aan proberen te gaan en het leek erop dat we ze gingen missen, maar uiteindelijk zagen we toch kort 1 ex. vanaf het parkeerterrein bij het bezoekerscentrum.
77. **Eastern Screech-Owl** (*Megascops asio asio*)
1 roestend ex. in Long Point op 9 en 10 mei (dezelfde vogel) en 1 ex. kort vliegend gezien in de schemer in Rondeau op 11 mei.
78. **Great Horned Owl** (*Bubo virginianus*)
1 adult en 2 takkelingen bij Lake St. Clair op 15 mei. Met name de adult liet zich heel fraai bekijken – dit was genieten!
79. **Belted Kingfisher** (Bandijsvogel, *Megasceryle alcyon*)
Op 4 dagen werd 1 ex. waargenomen – relatief weinig!
80. **Yellow-bellied Sapsucker** (*Sphyrapicus varius*)
Gezien tijdens elk bezoek aan Backus Woods met 2 exx. op 8 mei, 7 exx. op 9 mei en 2 exx. op 10 mei.
81. **Red-headed Woodpecker** (*Melanerpes erythrocephalus*)
Op 4 dagen waargenomen met max. 6 exx. op één dag. Zowel in Rondeau als Point Pelee zagen we deze geweldige soort met enige regelmaat!
82. **Red-bellied Woodpecker** (*Melanerpes carolinus*)
Op 9 dagen waargenomen met max. 3 exx. op één dag.

83. **Downy Woodpecker** (*Dryobates pubescens medianus*)
Op 9 dagen waargenomen met max. 7 exx. op één dag.
84. **Hairy Woodpecker** (*Dryobates villosus villosus*)
Op 4 dagen waargenomen (Long Point en Rondeau) met max. 2 exx. op één dag. Het kleedt lijkt heel erg op Downy maar het grotere formaat en met name de langere snavel geven de soort een heel ander karakter.
85. **Pileated Woodpecker** (*Dryocopus pileatus*)
Op 6 dagen waargenomen met max. 2 exx. op één dag. Prima gezien maar nog meer gehoord.
86. **Northern Flicker** (*Colaptes auratus luteus*)
Op 9 dagen waargenomen met max. 7 exx. op één dag. Northern Flickers zijn overigens verdienstelijke trekvogels zijn en vroeger in het seizoen is het mogelijk om 100+ te zien op een dag, met ook veel op dagtrek. De oostelijke variant, "Yellow-shafted Flicker", wordt soms als andere ondersoort beschouwd dan de westelijke, "Red-shafted Flicker".
87. **American Kestrel** (*Falco sparverius*)
Op 3 dagen werd 1 ex. waargenomen.
88. **Merlin** (Smelleken, *Falco columbarius columbarius*)
1 ex. op 12 mei in Rondeau. Dit is één van de drie Amerikaanse ondersoorten en niet dezelfde als in Europe
89. **Peregrine Falcon** (Slechtvalk, *Falco peregrinus anatum*)
Een paartje op en bij een nest bij de Burlington Canal Bridge op 7 mei. Dit is een andere ondersoort dan in Europa.
90. **Eastern Wood-Pewee** (*Contopus virens*)
Op 5 dagen waargenomen met max. 10 exx. op één dag.
91. **Yellow-bellied Flycatcher** (*Empidonax flaviventris*)
Opvallend genoeg maar liefst 8 exx. in Point Pelee op 14 mei en niet op andere dagen waargenomen.
92. **Acadian Flycatcher** (*Empidonax virescens*)
1 ex. in Mosa Forest op 16 mei. Een late trekvogel die ook in Backus Woods broedt maar daar eerder tijdens de reis nog niet aanwezig was. Bereikt in deze omgeving ook de noordgrens van het verspreidingsgebied en is daardoor nogal schaars als doortrekker.
93. **Willow Flycatcher** (*Empidonax traillii traillii*)
Een relatief vroege vogel op 11 mei in Rondeau, 2 exx. in St. Clair NWA op 15 mei en 2 exx. in Hillman Marsh op 16 mei. De eerste vogel was een doortrekker (die we dankzij wat uitgelokte vocalizaties met zekerheid van Alder Flycatcher konden onderscheiden) en de laatste 4 waren lokale broedvogels. In vrij open en nat gebied is de soort is een algemene broedvogel in de omgeving, maar komt erg laat aan. De hier schaarsere, zeer gelijkende Alder Flycatcher komt nóg later en zagen we zoals al min of meer verwacht helaas niet (en hetzelfde geldt voor Olive-sided Flycatcher).
94. **Least Flycatcher** (*Empidonax minimus*)
Op 7 dagen waargenomen (elke dag vanaf 10 mei) en opvallend algemeen met 20+ op 3 verschillende dagen (max. ca. 25 exx. op één dag).
95. **Eastern Phoebe** (*Sayornis phoebe*)
Relatief weinig: op 4 dagen waargenomen met max. 2 exx. op één dag. Deze vliegenvanger is een korte-afstandstrekker die al in april doortrekt en de vogels die wij zagen waren lokale broedvogels.
96. **Great Crested Flycatcher** (*Myiarchus crinitus*)
Op 5 dagen waargenomen met max. 7 exx. op één dag – meer gehoord dan gezien zoals typisch is voor de soort die graag in de kruinen van hoge bomen zit.

97. **Eastern Kingbird** (*Tyrannus tyrannus*)
Op 9 dagen waargenomen met max. ca. 25 exx. op één dag. Een algemene en aantrekkelijke grote vliegenvanger.
98. **White-eyed Vireo** (*Vireo griseus*)
Maar liefst 4: 1 ex. in Rondeau op 12 mei, 1 ex. in Pelee op 13 mei en 2 exx. in Pelee op 14 mei. Deze soort zit graag laag en is iets van een skulker – we vonden 3 van de 4 vogels dan ook op zang.
99. **Bell's Vireo** (*Vireo bellii bellii*)
1 ex. in Pelee op 12 mei. Een dwaalgast die wat verder naar het zuidwesten broedt en eerder op de dag ontdekt was door een Nederlandse groep vogelaars! Net als *White-eyed Vireo* foerageert de soort graag laag in dicht struweel. Deze hield zich met name op in jeneverbessenstruikjes vlak langs het strand van Lake Erie.
100. **Yellow-throated Vireo** (*Vireo flavifrons*)
1 ex. in Rondeau op 11 mei en 2 exx. in Pelee op 14 mei. Deze soort broedt in de omgeving maar is schaars op doortrek omdat we nabij de noordkant van het verspreidingsgebied zitten. Een heel fraaie vireo!
101. **Blue-headed Vireo** (*Vireo solitarius*)
Op 6 dagen waargenomen met max. 5 exx. op één dag. Opvallend veel aangezien de soort een korte-afstandstrekker is die vroeger in het seizoen piekt.
102. **Philadelphia Vireo** (*Vireo philadelphicus*)
Op alle laatste 4 dagen waargenomen met max. 11 exx. op één dag, een indrukwekkend aantal voor deze schaarse en laat doortrekkende vireo.
103. **Warbling Vireo** (*Vireo gilvus gilvus*)
Op 8 dagen waargenomen met max. ca. 10 exx. op één dag. De meerderheid van de waargenomen vogels waren waarschijnlijk lokale broeders.
104. **Red-eyed Vireo** (Roodoogvireo, *Vireo olivaceus*)
Alleen op de laatste 4 dagen waargenomen met max. ca. 15 exx. op één dag. Een late aankomst! Lokaal is dit is een van de meest algemene broedvogels die naar de Neotropen trekt, maar dat zou je niet zeggen op basis van onze waarnemingen.
105. **Blue Jay** (*Cyanocitta cristata*)
Elke dag waargenomen met max. ca. 30 exx. op één dag. Blue Jays kunnen met zéér grote aantallen dagtrekken, maar dit is vaak net iets eerder in het seizoen. Rond de punt van Point Pelee zagen we er een handjevol op vrij grote hoogte langsvliegen.
106. **American Crow** (*Corvus brachyrhynchos*)
Op 8 dagen waargenomen met max. ca. 10 exx. op één dag. We zochten kort om de hier heel schaarse en lokale *Fish Crow* in Forty Mile Creek Park.
107. **Black-capped Chickadee** (*Poecile atricapillus*)
Op 8 dagen waargenomen met max. 6 exx. op één dag.
108. **Tufted Titmouse** (*Baeolophus bicolor*)
2 exx. in een park in Brantford op 16 mei. De laatste doelsoort van de reis! De soort bereikt hier de noordrand van het verspreidingsgebied.
109. **Horned Lark** (Strandleeuwerik, *Eremophila alpestris praticola*)
Op 3 dagen waargenomen met max. 2 exx. op één dag. Eén van de vele Noord-Amerikaanse ondersoorten. Deze soort zit hier graag op en vlak langs de weg in uitgebreide landbouwgebieden en als chauffeur zag ik ze bijna dagelijks vanuit het busje, maar zelden was er de mogelijkheid om ze te laten zien. Op de laatste dag kregen we er één mooi in de telescoop.
110. **Northern Rough-winged Swallow** (*Selgideroptix serripennis*)
Op 4 dagen waargenomen met max. ca. 20 exx. op één dag.

111. **Purple Martin** (*Progne subis*)
Op 6 dagen waargenomen met max. ca. 25 exx. op één dag.
112. **Tree Swallow** (*Tachycineta bicolor*)
Op 9 dagen waargenomen met max. ca. 50 exx. op één dag.
113. **Sand Martin** (Oeverzwaluw, US: Bank Swallow, *Riparia riparia riparia*)
Op 5 dagen waargenomen met max. ca. 50 exx. op één dag. Dit is dezelfde ondersoort als in Europa.
114. **Barn Swallow** (Boerenzwaluw, *Hirundo rustica erythrogaster*)
Op 8 dagen waargenomen met max. ca. 25 exx. op één dag. Dit is een andere ondersoort dan in Europa en de verschillen zijn vrij opvallend: o.a. een rodere onderkant en een dunnere en vaak gebroken borstband.
115. **Cliff Swallow** (*Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota*)
1 ex. nabij Hagersville op 8 mei, 1 ex. in Rondeau op 12 mei, en ca. 10 exx. in Hillman Marsh op 16 mei. Een erg fraaie zwaluw maar ook de meest schaarse van de lokale soorten.
116. **Ruby-crowned Kinglet** (*Corthylio calendula*)
Op 8 dagen waargenomen met max. ca. 15 exx. op één dag. Deze korte-afstandstrekker piekt eind april-begin mei en dunde uit tegen het einde van de reis met geen waarnemingen op de laatste twee dagen.
117. **Golden-crowned Kinglet** (*Regulus satrapa*)
1 ex. in Backus Woods op 8 mei. Deze soort trekt eerder door dan Ruby-crowned (en overwintert hier ook) en was daardoor al bijna geheel verdwenen!
118. **Red-breasted Nuthatch** (*Sitta canadensis*)
Op 4 dagen waargenomen met max. 3 exx. op één dag.
119. **White-breasted Nuthatch** (*Sitta carolinensis carolinensis*)
Op 5 dagen waargenomen met max. 2 exx. op één dag.
120. **Brown Creeper** (*Certhia americana americana*)
1 ex. zingend en daarna leuk gezien in Backus Woods op 8 mei. Deze soort trekt met name in april door en broedt heel lokaal, zoals waarschijnlijk ook in Backus Woods.
121. **Blue-grey Gnatcatcher** (*Polioptila caerulea caerulea*)
Op 9 dagen waargenomen met max. ca. 10 exx. op één dag.
122. **House Wren** (*Troglodytes aedon aedon*)
Elke dag waargenomen met max. ca. 15 exx. op één dag.
123. **Winter Wren** (*Troglodytes hiemalis*)
1 ex. in Forty Mile Creek Park op 7 mei, 1 ex. zingend in Backus Woods op 10 mei en 1 ex. in Rondeau op 11 mei.
124. **Marsh Wren** (*Cistothorus palustris dissaepus*)
Op 4 dagen gehoord met max. 6 exx. op één dag, en één gezien in St. Clair NWA op de laatste van deze dagen.
125. **Carolina Wren** (*Thryothorus ludovicianus*)
Elke dag waargenomen (meer gezien dan gehoord) met max. 3 exx. op één dag. Deze soort is hier relatief schaars nabij de noordgrens van het verspreidingsgebied.
126. **Grey Catbird** (*Dumetella carolinensis*)
Op 9 dagen waargenomen met max. ca. 50 exx. op één dag. Lokale broedvogel en doortrekker.
127. **Brown Thrasher** (*Toxostoma rufum*)
Op 4 dagen waargenomen met max. 3 exx. op één dag.
128. **Northern Mockingbird** (Spotlijster, *Mimus polyglottos*)
1 ex. bij de Burlington Canal Bridge op 7 mei en 1 ex. nabij Hagersville op 8 mei.

129. **Eastern Bluebird** (*Sialia sialis sialis*)
Slechts eenmaal gezien: 2 exx. nabij Backus Woods op 9 mei.
130. **Veery** (*Catharus fuscescens fuscescens*)
Op 7 dagen waargenomen met max. 4 exx. op één dag. Doortrekker.
131. **Grey-cheeked Thrush** (Grijswangdwerglijster, *Catharus minimus*)
1 ex. op het Rondeau Marsh Trail op 12 mei. De minst algemene en laatst doortrekkende van de lokale *Catharus*-lijsters.
132. **Swainson's Thrush** (*Catharus ustulatus swainsoni*)
Op 7 dagen waargenomen (dagelijks vanaf 10 mei) met max. ca. 20 exx. op één dag. De meest algemene van de doortrekkende *Catharus*-lijsters.
133. **Hermit Thrush** (*Catharus guttatus faxoni*)
1 ex. in Long Point op 9 mei en verassend genoeg nog tweemaal 1 ex. op Point Plee op 12 en 16 mei. Een korte-afstandstrekker en vroegere doortrekker met piek in april die ook zeer lokaal broedt in de omgeving.
134. **Wood Thrush** (*Hylocichla mustelina*)
Op 6 dagen waargenomen met max. ca. 10 exx. op één dag. Zowel een doortrekker als vrij algemene lokale broedvogel.
135. **American Robin** (Roodborstlijster, *Turdus migratorius*)
Elke dag waargenomen met max. ca. 50 exx. op één dag.
136. **Cedar Waxwing** (*Bombycilla cedrorum*)
Op 5 dagen waargenomen met max. ca. 70 exx. op één dag. De meeste waarnemingen waren van langsvliegende groepjes, maar in Long Point zagen we ze ook aan de grond. Zowel een doortrekker als vrij algemene lokale broedvogel.
137. **House Finch** (*Haemorhous mexicanus*)
Op 6 dagen waargenomen met max. ca. 10 exx. op één dag.
138. **American Goldfinch** (*Spinus tristis tristis*)
Op 8 dagen waargenomen met max. ca. 10 exx. op één dag.
139. **Grasshopper Sparrow** (*Ammodramus savannarum*)
1 ex. gehoord op 9 mei en 2 exx. waarvan 1 één gezien op 10 mei nabij Backus Woods.
140. **Chipping Sparrow** (*Spizella passerina*)
Op 7 dagen waargenomen met max. ca. 20 exx. op één dag. Een algemene broedvogel in de omgeving.
141. **Clay-colored Sparrow** (*Spizella pallida*)
3 exx. op 12 mei in Keith McLean CA bij Rondeau. Een schaarse doortrekker.
142. **Field Sparrow** (*Spizella pusilla*)
Op 4 dagen waargenomen met max. ca. 6 exx. op één dag. Een broedvogel in de omgeving in halfopen habitat.
143. **White-crowned Sparrow** (Witkruingors, *Zonotrichia leucophrys leucophrys*)
Op 5 dagen waargenomen met max. ca. 40 exx. op één dag. Een overwintelaar en vooral doortrekker in de omgeving. Verreweg de meest algemene ondersoort is hier de oostelijke *leucophrys* maar westelijke *gambelii* met lichte teugels en gelere snavel duiken soms ook op.
144. **White-throated Sparrow** (Witkeelgors, *Zonotrichia albicollis*)
Op 6 dagen waargenomen met max. ca. 40 exx. op één dag. Een overwintelaar en vooral doortrekker in de omgeving. Een vroegere doortrekker dan White-crowned: terwijl we de hoogste aantallen White-crowned op 13 mei in Point Pelee zagen, waren de White-throated toen al bijna verdwenen.
145. **Vesper Sparrow** (*Pooecetes gramineus*)
1 ex. gehoord nabij Hagersville op 8 mei, 3 exx. nabij Backus Woods op 9 mei, en 1 ex. nabij Backus Woods op 10 mei. Een schaarse en achteruitgaande broedvogel in de omgeving.

146. **Savannah Sparrow** (*Passerculus sandwichensis savanna*)
8 exx. nabij Hagersville op 8 mei en 1 ex. op 11 mei in Rondeau. Een broedvogel in de omgeving.
147. **Song Sparrow** (Zanggors, *Melospiza melodia melodia*)
Op 9 dagen waargenomen met max. ca. 25 exx. op één dag. Een algemene broedvogel in de omgeving.
148. **Lincoln's Sparrow** (*Melospiza lincolni*)
Op 5 dagen waargenomen met max. 6 exx. op één dag. Prima aantallen voor deze vrij schaarse doortrekker in de omgeving.
149. **Swamp Sparrow** (*Melospiza georgiana*)
Op 6 dagen waargenomen met max. 7 exx. op één dag. Een vrij algemene broedvogel in moerasgebieden die we een paar keer prima zagen maar meer hoorden.
150. **Eastern Towhee** (*Pipilo erythrophthalmus erythrophthalmus*)
Op 5 dagen waargenomen met max. 2 exx. op één dag. Een broedvogel in de omgeving. Een paar andere soorten sparrows komen hier voor maar trekken eerder in het seizoen al weg of door, zoals *American Tree Sparrow*, *Fox Sparrow*, en *Dark-eyed Junco* (*Grijze Junco*).
151. **Yellow-breasted Chat** (*Icteria virens*)
1 ex. in Rondeau op 11 mei, helaas niet door iedereen gezien. Deze zuidelijkere soort is hier met name een erg schaarse overschieter.
152. **Bobolink** (*Dolichonyx oryzivorus*)
Ca. 15 exx. fraai gezien nabij Hagersville op 8 mei, 1 ex. in Long Point op 8 mei, 2 exx. overvliegend nabij Backus Woods op 9 mei, en 3 exx. overvliegend in Rondeau op 11 mei. De eerstgenoemde vogels waren lokale broedvogels en alle anderen doortrekkers.
153. **Eastern Meadowlark** (*Sturnella magna magna*)
7 exx. fraai gezien nabij Hagersville op 8 mei.
154. **Orchard Oriole** (*Icterus spurius*)
Op 6 dagen waargenomen (met dagelijkse waarnemingen vanaf 12 mei) met max. ca. 15 exx. op één dag.
155. **Baltimore Oriole** (Baltimoretroepiaal, *Icterus galbula*)
Op 9 dagen waargenomen met max. ca. 100 exx. op één dag. Zowel een algemene lokale broedvogel als doortrekker in de omgeving.
156. **Red-winged Blackbird** (*Agelaius phoeniceus*)
Elke dag waargenomen met max. ca. 100 exx. op één dag.
157. **Rusty Blackbird** (*Euphagus carolinus*)
Ca. 30 exx. op 8 mei (en dezelfde vogels gehoord op 9 mei) in Backus Woods. Dankzij de kenmerkende zang pikten we deze vogels op en nadat we richting het geluid liepen, foerageerde een mooie groep op de grond in een ondergelopen stuk in het bos. Een boreale broeder die hier overwintert en vooral doortrekt in april, dus een leuke bonus voor de reis! Dit is een soort die meer van bos houdt dan andere blackbirds en helaas sterk achteruit gaat.
158. **Yellow-headed Blackbird** (Geelkoptroepiaal, *Xanthocephalus xanthocephalus*)
3 exx. (2 mannetjes en 1 vrouwtje) bij Lake St. Clair op 15 mei. Dit is de meest oostelijke broedplek van deze fraaie westelijke soort.
159. **Brown-headed Cowbird** (*Molothrus ater*)
Op 9 dagen waargenomen met max. ca. 25 exx. op één dag.
160. **Common Grackle** (Glanstroepiaal, *Quiscalus quiscula versicolor*)
Elke dag waargenomen met max. ca. 50 exx. op één dag.
161. **Ovenbird** (*Seiurus aurocapilla*)
Op 9 dagen waargenomen met max. 5 exx. op één dag.

162. **Louisiana Waterthrush** (*Parkesia motacilla*)
1 zingend mannetje (ook mooi gezien) in Backus Woods op 9 mei. Deze warbler bereikt hier de noordgrens van het verspreidingsgebied en broedt in de omgeving alleen in Backus Woods. Hierdoor is de soort ook schaars op doortrek en met name vroeger in het seizoen: dit is een van de eerst aankomende lange-afstandstrekken.
163. **Northern Waterthrush** (Noordse Waterlijster, *Parkesia noveboracensis*)
Samen met *Whip-poor-will* de enige “heard-only” soort op de lijst. In Point Pelee hoorden we ze meerdere malen (2 op 13 en op 14 mei en 1 op 16 mei), maar opvallend genoeg hadden we geen zichtwaarnemingen van deze normaal toch niet zo schaarse soort.
164. **Golden-winged Warbler** (*Vermivora chrysoptera*)
We waren heel blij met 1 vrouwtje in Pelee op 13 mei, na eerder al twee keer de soort net hebben gemist. Dit is een heel schaarse (en bedreigde) soort en bovendien trekken zowel Golden- als Blue-winged relatief vroeg in het seizoen – en aangezien vrouwtjes later trekken dan mannetjes, was het dan ook geen verrassing dat we een vrouwtje zagen tegen het einde van de reis.
165. **Blue-winged Warbler** (*Vermivora cyanoptera*)
1 ex. in Pelee op 13 mei en 1 ex. gehoord in Mosa Forest op 16 mei. Ook een schaarse soort, maar algemener dan de zustersoort Golden-winged en ook een broedvogel in de omgeving. In Backus Woods waren ze helaas nog niet aangekomen aan het begin van de reis en het was dan ook een opluchting toen we er eindelijk één zagen op 13 mei.
166. **Black-and-white Warbler** (*Mniotilta varia*)
Op 7 dagen waargenomen met max. 5 exx. op één dag.
167. **Prothonotary Warbler** (*Protonaria citrea*)
1 ex. in Rondeau op 11 mei en 1 ex. in Pelee op 14 en 15 mei. Een heel schaarse lokale broedvogel, maar vrijwel gegarandeerd op deze twee plekken waar een paar paden heel mooi door de moerasbossen met territoria van deze soort lopen.
168. **Tennessee Warbler** (*Leiothlypis peregrina*)
Op 4 dagen (de laatste 4) waargenomen met max. 5 exx. op één dag. Een algemene maar heel late doortrekker waarvan we slechts het begin van de doortrek meepikten. Ook is dit een van de weinige warbler soorten (tezamen met bv. *Blackpoll*, *Yellow-rumped* en *Palm*) die op doortrek de voorkeur geeft aan grotendeels open habitat in plaats van bos.
169. **Nashville Warbler** (*Leiothlypis ruficapilla ruficapilla*)
Op 7 dagen waargenomen met max. 5 exx. op één dag. Een vrij algemene doortrekker, maar niet in heel grote aantallen.
170. **Mourning Warbler** (*Geothlypis philadelphia*)
1 vrouwtje op 13 mei en 2 mannetjes op 14 mei in Pelee. Een schaarse, skulkende en late doortrekker en dus was het prettig om er 3 te zien, waarvan één wel heel goed meewerkte. Opvallend genoeg nooit horen zingen.
171. **Common Yellowthroat** (*Geothlypis trichas*)
Op 7 dagen waargenomen met max. ca. 20 exx. op één dag.
172. **Hooded Warbler** (*Setophaga citrina*)
1 mannetje in Rondeau op 11 mei, 1 mannetje in Pelee op 14 mei en 3 zingende mannetjes in Mosa Forest op 16 mei. Ook een soort van loofbos die hier nabij de noordgrens van het verspreidingsgebied komt en daarmee vrij schaars is als doortrekker. Wel broedt de soort lokaal maar zoals meer soorten waren ze nog niet aangekomen in Backus Woods aan het begin van de reis – maar wel in Mosa Forest aan het eind van de reis.
173. **American Redstart** (*Setophaga ruticilla*)
Op 8 dagen waargenomen met max. ca. 15 exx. op één dag. Deze soort broedt ook in de omgeving maar waarschijnlijk betrof het overgrote deel van onze waarnemingen doortrekkers.
174. **Cape May Warbler** (*Setophaga tigrina*)
Op 4 dagen waargenomen met max. 4 exx. op één dag. Relatief kleine aantallen van deze

soort die het samen met Bay-breasted Warbler de laatste jaren erg goed doet door Spruce Budworm outbreaks in het boreale bos waar ze broeden.

175. **Cerulean Warbler** (*Setophaga cerulea*)
1 of 2 vrouwtjes in Pelee op 14 mei (bij de 2^e waarneming waren we niet zeker of het dezelfde vogel betrof die mogelijk was opgeschoven). Helaas niet het schitterend blauwe mannetje, maar wel een opluchting om deze soort tegen het einde van de reis nog te zien. De soort broedt in Backus Woods en ik zag daar heel kort een mannetje tijdens ons tweede bezoek, maar ze waren er duidelijk grotendeels nog niet aangekomen. Ook moet worden opgemerkt dat de vogels in oud loofbos broeden en zich graag helemaal bovenin hoge bomen bevinden, waardoor waarnemingen in de broedgebieden vaak niet optimaal zijn. Zodanig hoopten we dus ook op een doortrekker – die lang op zich liet wachten.
176. **Northern Parula** (*Setophaga americana*)
Op 5 dagen waargenomen met max. 18 exx. (!) op één dag. Een soort die je regelmatig maar meestal in kleine aantallen op doortrek ziet.
177. **Magnolia Warbler** (*Setophaga magnolia*)
Op 8 dagen waargenomen met max. ca 35 exx. op één dag. Leuke aantallen van deze heel fraaie doortrekker!
178. **Bay-breasted Warbler** (*Setophaga castanea*)
Op 6 dagen waargenomen met max. ca 40 exx. op één dag. Ook van deze soort leuke aantallen! Zoals opgemerkt onder Cape May Warbler doet deze soort het momenteel goed. Vrij veel warblers hebben ook een aardig uitgesproken winterkleed, die in een aantal gevallen zelfs niet te onderscheiden is van zomerkleed. Maar Bay-breasted Warbler is één van de soorten die echt een stuk aantrekkelijker is in het voorjaar en zo ook bijvoorbeeld Magnolia, Chestnut-sided en Blackpoll Warbler.
179. **Blackburnian Warbler** (*Setophaga fusca*)
Op 6 dagen waargenomen met max. 7 exx. op één dag. Een ongelooflijk fraaie warbler, doortrekker in deze omgeving.
180. **American Yellow Warbler** (*Setophaga aestiva*)
Elke dag waargenomen met max. ca 150 exx. op één dag. Heel algemeen zowel als broedvogel als doortrekker.
181. **Chestnut-sided Warbler** (*Setophaga pensylvanica*)
Op 8 dagen waargenomen met max. ca. 15 exx. op één dag. Deze soort broedt lokaal ook in de omgeving maar waarschijnlijk betrof het overgrote deel van onze waarnemingen doortrekkers.
182. **Blackpoll Warbler** (Zwartkopzanger, *Setophaga striata*)
Tweemaal 2 mannetjes op 13 mei en 14 mei in Pelee. Een vrij algemene maar heel late doortrekker, zoals voor Tennessee Warbler pikten we daardoor slechts het begin van de doortrek mee.
183. **Black-throated Blue Warbler** (*Setophaga caerulescens caerulescens*)
Op 7 dagen waargenomen met max. 8 exx. op één dag. Een doortrekker waarvan de mannetjes er geheel anders uitzien dan de grotendeels “undercover” vrouwtjes – die gelukkig nog wel goed te herkennen zijn aan het kleine maar opvallende witte handpenvlekje.
184. **Palm Warbler** (*Setophaga palmarum palmarum*)
Op 8 dagen waargenomen met max. 6 exx. op één dag. Een korte(re)-afstandstrekker die iets vroeger piekt maar nog in aardige aantallen aanwezig was. Palm Warbler heeft twee vrij goed te onderscheiden ondersoorten, “Western” (*palmarum*) en “Yellow” (oostelijk; *hypochrysea*). Wij zagen alleen de hier talrijkere Western.
185. **Pine Warbler** (*Setophaga pinus*)
2 zingende mannetjes (1 gezien) in Backus Woods op 8 mei, 1 zingend in Long Point op 9 mei, en 1 zingend in Mosa Forest op 16 mei.
186. **Myrtle (Yellow-rumped) Warbler** (Mirtezanger, *Setophaga coronata coronata*)
Op 5 dagen waargenomen met max. ca. 25 exx. op één dag. Tegenwoordig (door IOC) gesplit

van de westelijke variant, "Audubon's Warbler". Grotendeels een korte-afstandstrekker en de enige warbler die ook lokaal (in kleine aantallen) overwintert. De voorjaars trek piekt daardoor eerder en terwijl voor ons op 8 en 9 mei deze soort tezamen met Yellow Warbler nog de meest algemene warbler was, waren ze tegen het einde van het bezoek bijna geheel verdwenen: tijdens de laatste 4 dagen zagen we nog 1 exemplaar. Leuk om deze overgang in soortensamenstelling zo mee te maken.

187. **Black-throated Green Warbler** (*Setophaga virens*)
Op 6 dagen waargenomen met max. ca. 15 exx. op één dag. Een relatief algemene doortrekker.
188. **Canada Warbler** (*Cardellina canadensis*)
Op 5 dagen waargenomen met max. 3 exx. op één dag (9 vogels totaal). Best veel waarnemingen van deze altijd wat schaarse, vaak skulkende, en ook late doortrekker!
189. **Wilson's Warbler** (*Cardellina pusilla pusilla*)
1 mannetje op 13 mei en 4 exx. op 14 mei. Ook een wat schaarse en late doortrekker.
190. **Scarlet Tanager** (*Piranga ludoviciana*)
Op 5 dagen waargenomen met max. 6 exx. op één dag. Relatief weinig waarnemingen van deze soort.
191. **Northern Cardinal** (*Cardinalis cardinalis*)
Elke dag waargenomen met max. 6 exx. op één dag.
192. **Rose-breasted Grosbeak** (*Pheucticus ludovicianus*)
Op 8 dagen waargenomen met max. ca. 30 exx. op één dag.
193. **Indigo Bunting** (Indigogors, *Passerina cyanea*)
Op 4 dagen waargenomen met max. 7 exx. op één dag. Relatief weinig waarnemingen van deze soort die in de omgeving ook een algemene broedvogel is. Waarschijnlijk waren velen nog niet aangekomen – zo hadden we ons hoogste aantal op de laatste dag tijdens ons korte bezoek aan Mosa Forest, waar ze overal leken te zingen.

Geïntroduceerd & hybride

1. **Mute Swan** (Knobbelzwaan, *Cygnus olor*)
Op 8 dagen waargenomen met max. ca. 15 exx. op één dag.
2. **Rock Pigeon** (Rotsduif / Stadsduif, *Columbia livia f. domestica*)
Op 4 dagen waargenomen met max. 20 exx. op één dag.
3. **European Starling** (Spreew, *Sturnus vulgaris*)
Op 9 dagen waargenomen met max. ca. 100 exx. op één dag.
4. **House Sparrow** (Huismus, *Passer domesticus*)
Op 9 dagen waargenomen met max. ca. 10 exx. op één dag.
5. **Black Duck x Mallard**
1 ex. in Hillman Marsh op 16 mei. Zag er bijna helemaal als een Black Duck uit, maar met toch redelijk opvallende lichte "mottling" op de flanken, wat ons niet lekker zat.

Zoogdieren

1. **Red Fox** (Vos, *Vulpes vulpes*)
1 ex. op 7 mei en 1 ex. op 8 mei.
2. **Coyote** (*Canis latrans*)
Erg leuk om 1 ex. mooi te zien langs de Niagara River op 7 mei.
3. **Eastern Grey Squirrel** (Grijze Eekhoorn, *Sciurus carolinensis*)
Op 8 dagen waargenomen met max. ca. 25 exx. op één dag.
4. **North American River Otter** (*Lontra canadensis*)
1 ex. nabij Backus Woods op 8 mei.

5. **Eastern Chipmunk** (*Tamias striatus*)
Op 4 dagen waargenomen met max. ca. 10 exx. op één dag.
6. **Eastern Cottontail** (*Sylvilagus floridanus*)
Op 4 dagen waargenomen met max. 5 exx. op één dag.
7. **American Red Squirrel** (*Tamiasciurus hudsonicus*)
1 ex. in Rondeau op 11 mei
8. **Muskrat** (Muskusrat, *Ondatra zibethicus*)
Op 3 dagen waargenomen met max. 5 exx. op één dag.
9. **Raccoon** (Gewone Wasbeer, *Procyon lotor*)
1 ex. slapend in een boomhol in Pelee op 14 mei.